

Số: 01/TB-TYT

Phú Lãm, ngày 22 tháng 01 năm 2020

## THÔNG BÁO

### V/V tiêm vaccin phòng bệnh 5 trong 1 loại mới

Thực hiện số 601/KH-TTYT ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Trung tâm y tế Hà Đông về Triển khai vắc xin phối hợp DPT-VBG-Hib do Viện huyết thanh Ấn Độ (SII) sản xuất trong tiêm chủng mở rộng quận Hà Đông, Trạm y tế Phú Lãm triển khai tổ chức tiêm vắc xin 5 trong 1 loại mới phòng 5 bệnh: bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B và viêm phổi do vi khuẩn Hib.

Vắc xin mới này có tên là DPT-VGB-Hib do Viện huyết thanh Ấn Độ (SII) sản xuất. Vắc xin này đã được cấp phép lưu hành tại Việt Nam từ tháng 9/2018. Vắc xin đạt tiêu chuẩn tiên thẩm định của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) từ năm 2010. Tính tới nay hơn 600 triệu liều vắc xin DPT-VGB-Hib(SII) đã được sử dụng ở trên 79 quốc gia.

- Đối tượng tiêm phòng: là toàn bộ trẻ đủ 2 tháng tuổi đến dưới 1 tuổi chưa tiêm chủng đầy đủ 3 mũi vắc xin 5 trong 1 hoặc 6 trong 1.
- Thời gian tiêm phòng: vào sáng ngày thứ 4 hàng tuần.
- Địa điểm: tại trạm y tế phường Phú Lãm.

Sau tiêm chủng Vắc xin **Phối hợp DPT-VBG-Hib do Viện huyết thanh Ấn Độ (SII)** trẻ có thể có một số các phản ứng thông thường như sốt nhẹ ( $<38,5^{\circ}\text{C}$ ), đau hoặc sưng tấy nhẹ tại chỗ tiêm, quấy khóc,... Tuy nhiên, các phản ứng này sẽ tự khỏi trong vòng 1 ngày. Một số phản ứng có thể gặp khi sử dụng vắc xin Phối hợp DPT-VBG-Hib do Viện huyết thanh Ấn Độ (SII) cũng giống như sử dụng vắc xin **5 trong 1 khác** như:

- Khóc dai dẳng trên 3 giờ trong vòng 48 giờ sau tiêm vắc xin với tỷ lệ là  $<1/100$  liều sử dụng.
- Co giật có kèm theo sốt hoặc không sốt trong vòng 3 ngày sau tiêm vắc xin với tỷ lệ là  $<1/100$  liều sử dụng.
- Giảm trương lực cơ, giảm đáp ứng xảy ra trong vòng 48 giờ với tỷ lệ là 1-2/1000 liều.
- Sốc phản vệ có thể xảy ra với tỷ lệ 20/1 triệu liều.

Để công tác tiêm phòng cho trẻ có hiệu quả tốt và tránh được các biến chứng xảy ra sau tiêm chủng cho trẻ, Trạm y tế đề nghị các bậc phụ huynh hãy thực hiện tốt các nội dung:


1. Cho trẻ ở lại 30 phút tại điểm tiêm chủng để được cán bộ y tế theo dõi và kịp thời xử trí nếu có những phản ứng bất thường xảy ra.

2. Tiếp tục theo dõi trẻ sau tiêm chủng tại nhà ít nhất 03 ngày sau tiêm chủng:

- Người theo dõi trẻ phải là người trưởng thành và biết chăm sóc trẻ.
- Bé, quan sát trẻ thường xuyên và chú ý không chạm, đè vào chỗ tiêm.
- Cho trẻ bú/ăn đủ bữa, đủ số lượng, đúng tư thế, không bú/ăn khi nằm...thường xuyên kiểm tra trẻ, đặc biệt ban đêm.
- Không đắp bất cứ thứ gì vào vị trí tiêm.
- Các dấu hiệu cần theo dõi: Tinh thần; tình trạng ăn, ngủ, nhiệt độ, phát ban, biểu hiện tại chỗ tiêm (sưng, đỏ...), trẻ sốt cần cập nhật nhiệt độ
- Nếu phát hiện bất thường gì về sức khỏe của trẻ thì phải báo ngay cho nhân viên y tế để kịp thời xử lý.
- Đưa ngay trẻ đến cơ sở y tế khi có các dấu hiệu:
  - + Tinh thần: quấy khóc dai dẳng, kích thích vật vã, lừ đừ, ...
  - + Khó thở: rút lõm hõm ức, bụng, tím môi, thở ậm ạch
  - + Sốt cao  $>39^{\circ}\text{C}$ , khó hạ nhiệt độ, hoặc sốt kéo dài hơn 24h
  - + Da nổi vân tím, tay chân lạnh
  - + Nôn trớ nhiều lần, bỏ bữa ăn, bú kém, bỏ bú
  - + Co giật
  - + Phát ban
  - + Hoặc khi trẻ có biểu hiện bất thường khác khiến cha mẹ lo lắng.
- Không tự ý dùng thuốc. Dùng thuốc theo chỉ dẫn của cán bộ y tế. Nếu trẻ sốt cần cập nhật nhiệt độ, theo dõi sát, chườm nước ấm, cởi rộng quần áo. Không nên dùng các loại thuốc lá, cây... khi chưa có chỉ định của nhân viên y tế. Dùng thuốc hạ sốt theo hướng dẫn của cán bộ y tế và tư vấn nhân viên y tế trước và sau khi xử lý.

Vì sức khỏe gia đình và cộng đồng, nhằm nâng cao sức đề kháng của trẻ để chống lại các loại dịch bệnh. Trạm y tế Phú Lâm thông báo đề nghị các gia đình đưa trẻ đến Trạm y tế để được tư vấn và tiêm phòng đầy đủ, đúng thời gian quy định.

**TM. TRẠM Y TẾ  
TRẠM TRƯỞNG**



**Nguyễn Minh Trường**